


Prije dolaska pilića



- Osigurajte pilićima biosigurnost i čisti peradnjak.
- Posložite opremu da omogući pilićima lagan pristup vodi i hrani kod prihvata.
- Hrana treba biti prosijana drobljena peleta bez prašine.
- U prvih 24 sata pilići ne bi smjeli imati hranu i vodu na udaljenosti većoj od 1m.
- Smjestite dodatne hranilice i pojilice blizu glavnih hranidbenih i pojidbenih sistema.
- Zagrijte peradnjak i stabilizirajte temperaturu i vlažnost zraka prije prihvata pilića – postignite temperaturu poda od 28-30°C.

Dolazak pilića



- Brzo istovarite i smjestite piliće.
- Osigurajte da su hrana i voda odmah dostupne.
- Intenzitet svjetla mora biti >20 luksa da se stimulira aktivnost pilića.
- Dopustite pilićima da se smjeste za 1-2 sata i provjerite njihovo ponašanje.

Ambijetalni ciljevi



- Ciljevi kod prihvata pilića su:
 - Temperatura zraka od 30°C (u visini pilića)
 - Temperatura stelje od 28-30°C
 - Relativna vlažnost od 60-70%
- Koristite ponašanje pilića za određivanje ispravnosti temperature.
- Preporučuje se ventilacija (bez propuha) da se osigura svjež zrak i uklanjanje otpadnih plinova, višak vlage i topline.
- Pilići su osjetljivi na tunelski sistem ventilacije i zato brzina zraka mora biti manja od 0.15 m/s.

Mjerila uspjeha



Punjenost voljke

- Kada se pilići počnu hraniti imaju sklonost da dobro i dosta jedu. Ako pilići dobro jedu i piju voljka je ispunjena mješavinom hrane i vode. Pažljiva provjera unutar prva 24 sata može ukazati na napredak kod pilića.
- Provjerite uzorak pilića 2 sata nakon prihvata da se uvjerite da su svi pilići pronašli hranu i vodu.
- Pažljivo provjerite voljke 30-40 pilića sa 3 ili 4 različita mjesta u peradnjaku.
- Procjena punjenosti voljke kod pilića:

Vrijeme provjere punjenosti voljke poslije prihvata	Cilj punjenosti voljke (% pilića sa punim voljkama)
2 sata	75%
12 sata	>85%
24 sata	>95%